



INWENTARYZACJA I WALORYZACJA PRZYRODNICZA DOLINY RZECI MLECZNEJ NA ODCINKU OD UL. MIESZKA I DO GRANIC ADMINISTRACYJNYCH RADOMIA (POW. 268,3 HA) ORAZ OD LINII KOLEJOWEJ DO GRANIC ADMINISTRACYJNYCH RADOMIA WRAZ Z DOLINĄ CIEKU GODOWSKIEGO (POW. 157 HA)

STRUKTURA PRZYRODNICZO-GOSPODARCZA GLEB - CHARAKTERYSTYKA GLEB

ARKUSZ 2 z 4

ROK WYKONANIA 2013

SKALA 1 : 10 000



- granice arkuszy
- granice obszaru opracowania

CHARAKTERYSTYKA GLEB

- przeważają gleby bielcowe, rzadziej brunatne o dominującym składzie piasków gliniastych lekkich podścielonych średnio głęboko gliną lekką sporadycznie gliną średnią
- przeważają gleby brunatne, rzadziej bielcowe lekkie piaszczyste o składzie piasków słabogliniastych na piasku luźnym oraz piasków luźnych lub sporadycznie podścielone głęboko gliną lekką
- gleby bielcowe, brunatne i czarne ziemie z piasków słabogliniastych lub gliniastych lekkich na piaskach luźnych, rzadziej na glinach sporadycznie gleby murszowo-mineralne z piasków luźnych
- przeważają gleby bielcowe i brunatne, piaszczyste z piasków słabogliniastych lub gliniastych lekkich podścielone średnio głęboko gliną
- gleby brunatne i bielcowe, wytworzone z piasków gliniastych mocnych przechodzących w glinę lekką lub średnią
- przeważają gleby bielcowe wytworzone z piasków gliniastych mocnych, rzadziej lekkich, podścielone gliną lekką lub średnią
- gleby w typie czarnych ziem, czasem mady, sporadycznie bielcowe lub brunatne - okresowo mokre
- gleby w typie czarnych ziem, czasem mady, sporadycznie bielcowe lub brunatne - właściwe
- gleby bagienne, głównie mulowo-torfowe i torfowe, często murszowe, płytkie na utworze mineralnym - właściwe
- gleby bagienne, głównie mulowo-torfowe i torfowe, często murszowe, płytkie na utworze mineralnym - okresowo mokre

